

胃カメラ検査を受けられる方へ

あなたの検査は、(月 日)です。午前 時 分までにご来院下さい。

胃カメラについて

- 当院ではご希望があれば検査による苦痛を和らげるため軽い**鎮静剤**を使用いたします(疾患によっては使用できない場合があります)。ご希望された場合は検査終了後も鎮静剤による影響のため、眠気やふらつきが残ることがありますので、当日の**車・バイク・自転車の運転は危険です**のでおやめ下さい。検査後は**1時間～2時間程度**休んでいただいております。(鎮静剤を使用しない場合の検査時間は15～30分程度です)鎮静剤を希望される方は予め申し出下さい。
- 心臓病等で**抗凝固剤**(血液を固まりにくくする薬=ワーファリン、パナルジン、バイアスピリン、バファリン81、エパデール、プレタール、アンプラーグ、その他抗凝固剤)を服用している方は、**必ず主治医とご相談下さい**。



検査前日(月 日)

- 夕食は夜8時までに済ませ、それ以後は何も食べないで下さい。
- 水、お茶だけは飲んでもかまいません。
- 普段から就寝前に薬を服用されている方はいつものようにお飲み下さい。



検査当日(月 日)

お薬手帳等がございましたら必ずご持参下さい。

- 検査終了まで食事はできません。(検査の1時間前までは水とお茶だけは飲んでもかまいません)
- 検査終了まで**禁煙**をお守り下さい。
- 血圧・心臓・喘息・神経内科・甲状腺・安定剤・痛み止め・その他医師から決まった時間に薬を飲むように言われている方は、朝6時から7時の間にお薬をお飲み下さい。ただし、糖尿病で**インシュリン注射・血糖を下げる薬を飲んでいる方は、当日は中止して下さい。**検査終了後の注射・内服時間等に関しましては当院看護師にお問合せ下さい。
- 当日、検査の前に当院担当医師から検査についての説明があります。その際、同意書にサインをして頂きます。**お車でご来院の場合、鎮静下(鎮静剤投与)における検査は実施出来ません**のであらかじめご了承下さい。
- 検査中ポリープを発見した場合、その場で切除することがあります。ポリープ切除による偶発症としては、稀に出血や穿孔(胃・腸に穴があく)が起こることがあります。出血はポリープ切除後1週間以内に多く認められますので、切除後1週間は激しい運動・飲酒・出張・旅行はしないで下さい。穿孔した場合は外科的手術が必要になる場合があります。当日、ポリープの切除を行った場合、**数日の入院が必要**になる場合があります。

検査に関するお問合せ、ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

函館市医師会病院 地域医療連携センター・クローバー
TEL0138-43-4876 (直通)

